



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์

ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 10/2569

สภาวะอากาศ

ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2569 ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก อีกทั้งในบางช่วงอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความรอนปกคลุม ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันได้ในบางพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ (โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก) จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน

ในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาและในที่มีทางน้ำไหลผ่าน รวมทั้งเฝ้าระวังลมกระโชกแรงที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกและขุดลอกคูคลองในน้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูก ทำให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน อาจทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้

สัตว์เลื้อย เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม และ ทำแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยเปียกฝน หนาวเย็น นอกจากนี้ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลื้อยอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลื้อยอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ปีก เช่น ไก่และกระเป๋ เป็นต้น รวมทั้งระวังสัตว์ศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ ริน และไร เป็นต้น มารบกวนสัตว์เลื้อยทำให้สัตว์เลื้อยชะงักการเจริญเติบโตและอาจนำโรคมานำสู่สัตว์เลื้อยได้

พืชไร่ ไม้ดอก และพืชผัก ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง ทำให้สภาพอากาศมีลักษณะร้อนสลับ ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคพืช เช่น โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด และโรคแอนแทรกโนส ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตเสียหายและด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ควรหมั่นกำจัดวัชพืชเพื่อลดความชื้นสะสมในแปลงและตัดวงจรแมลงศัตรูพืช

ไม้ผล : ในระยะที่ไม้ผลกำลังติดผลและเข้าสู่ระยะเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องระวังความเสียหายจากลมกระโชกแรง โดยใช้เชือกโยงกิ่งและค้ำยันกิ่งกับลำต้นให้มั่นคงแข็งแรง อีกทั้งการที่ฝนตกหนักหลังจากที่ดินแห้งแล้งมานาน อาจทำให้ต้นไม้ดูดซับน้ำกะทันหัน ส่งผลให้เกิด "อาการผลแตก" (Fruit cracking) จึงควรบริหารจัดการความชื้นในดินใหม่มีความสม่ำเสมอ

สัตว์น้ำ : ฝนที่ตกหนักถึงหนักมา อาจชะหน้าดินและล้างสิ่งสกปรกปนจากหน้าดินลงสู่แหล่งน้ำ เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้หน้าฝนระลอกแรกไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรเก็บในบ่อพักน้ำเพื่อตกตะกอนน้ำก่อน อีกทั้งหลังฝนตกหนัก อุณหภูมิน้ำจะเปลี่ยนแปลงกะทันหันและเกิดการแยกชั้นของน้ำ เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ละลายน้ำและเป็นการปรับสมดุลของอุณหภูมิในน้ำ

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3992322

NT

